

Слама

Цели на използване	Сламата, изсъхналите стебла на житните растения след жътвата, служи за изготвяне на сламени постели, за торене и за храна. Съществува слама от различни видове култури: от овес, от ечемик, от пшеница или от ръж.
Тип фураж	Груб фураж
Тип животни	Преживни, преди всичко млади животни и млекодайни крави, които не се доят (пресушени крави), коне
Сухо вещество	Над 84 %
Съдържание на енергия/ Хранителни стойности	Хранителните стойности и смилаемостта (лигнин) на органичните субстанции са ниски. Сурови влакнини 35% повече отколкото при сеното. Овесената и ечемичната слама е по-добре приета от животните. Чрез нарязване на ситно и смесване с меласа се достига по-добра консумация.
Време за сеитба	Зависи от региона и вида слама
Почва	Зависи от вида слама
Вода	Зависи от вида слама
Разнообразие на видовете	Зависи от типа почва
Нужни километри от отглеждането до кърмилото	Регионално оползотворяване
Климатични условия	Зависи от вида слама
Друго	Сламата е остатъка, т.е. това, което остава излишно след събирането на реколтата. Местните породи говеда – или тези, които са се напаснали към условията в региона – по принцип ядат с удоволствие сламата. Породите, които са за индустриално угояване, имат нужда и от допълнителни фуражи, богати на хранителни вещества.