

Paja

| | |
|---|---|
| Empleo | La paja – los tallos secados del cereal – sirven para cama, abono o forraje. Hay de diferentes cereales: paja de avena, de cebada, de trigo o centeno |
| Tipo de alimento | forraje |
| Especie de ganado | Rumiantes, sobre todo los animales jóvenes, y vacas lecheras que no están siendo ordeñadas, équidos |
| Rendimiento de materia seca | Más que 84% |
| Valor energético | Valor energético y digestibilidad (lignina) de la sustancia orgánica son bajos. Contenido de fibra bruta 35% por encima del heno Ganado come mejor el heno de avena y de cebada. Aumento de consumo se consigue a través de trituración y mezcla con melaza. |
| Siembra | Según región y tipo de cereal. |
| Suelo | Según tipo de cereal |
| Agua | Según tipo de cereal |
| Biodiversidad | Según tipo de cereal |
| Kms hechos entre cultivo y comedero/pesebre | regional |
| Condiciones climáticas | Según tipo de cereal |
| Otros | La paja es el „resto“, lo que „sobra“ a la hora de cosechar el grano del cereal. Las razas bovinas autóctonas – o sea las adaptadas a las condiciones en su región – suelen aprovechar muy bien la paja. Las razas industriales necesitan aporte de alimentos más nutritivos. |